


L. Spiegel, del.

Rhynchobedella sinensis, Blkr.

P Bleeker del.

Botia modesta, Blkr.



VERSL. IN MED. AFD. NATURK. 2. E. IV DEEL.

DESCRIPTION ET FIGURE

D'UNE ESPÈCE INÉDITE DE

R H Y N C H O B D E L L A D E C H I N E.

PAR

P. B L E E K E R.

Rhynchobdella sinensis Blkr.

Rhynchobd. corpore elongato compresso, altitudine 13 circ. in ejus longitudine, latitudine 2 circ. in ejus altitudine; capite $7\frac{1}{4}$ circ. in longitudine corporis; altitudine capitis $2\frac{2}{3}$ circ.-, latitudine capitis $3\frac{1}{2}$ circit. in ejus longitudine; oculis diametro 8 circ. in longitudine capitis; rostro oculo plus duplo longiore apice carnosu paulo tantum ante maxillam superiorem prominente tubulis nasalibus brevibus leviter trilobo, inferne non transversim striato; maxilla superiore sub oculi margine anteriore desinente; praeoperculo obtuse rotundato anacantho (inermi); pinna dorsali spinosa spinis postrорsum longitudine sensim ac- crescentibus, spina penultima spinis ceteris multo longiore; spinis analibus 2 anterioribus approximatis, 2^a longe a spina 3^a distante eaque conspicue longiore; pinnis dorsali et anali radiosum cum caudali unitis; caudali incisura nulla a dorsali et anali distineta; pinnis pectoralibus obtuse rotundatis, capite plus quadruplo brevioribus; squamis capite corporeque minimis sed bene conspicuis; colore corpore superne lateribusque fuscесcente-viridi; dorso fusco reticulato; capite inferne ventreque albidis; vitta oculo-caudali rubra lineae dorsali approximata eaque parallelia; pinnis flavescentibus vel aurantiacis, dorsali radiosa nigricante reticulata, anali vittis basali et intramarginali sat lata nigricante-fuscis; pectora-

libus media basi macula parva fuscescente; iride viridi margine pupillari aurea.

B. 6. D. 34/72. P. 22 ad 24. A. 3/66. C. 8.

Hab. China, in fluviis.

Longitudo speciminis descripti 199".

Cette espèce est voisine du *Rhynchobdella maculata* Rwdt (Mastacembelus maculatus CV.) par son préopercule sans armure et par ses nageoires verticales confluentes. Elle se fait reconnaître aisément par le système de coloration du corps et des nageoires, par le museau peu allongé, par le nombre des épines dorsales, etc. C'est la première espèce de la famille des Rhynchobdelloïdes qu'on vient de connaître de Chine.